

KULLANMA TALİMATI

ERTES⁷² 1.5 mg tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her tablet 1,5 mg levonorgestrel içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen şeker), mikrokristalin selüloz, Poloksamer 188, kroskarmelloz sodyum ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **ERTES⁷² nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ERTES⁷²'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ERTES⁷² nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ERTES⁷²'nin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. ERTES⁷² nedir ve ne için kullanılır?

ERTES⁷², korunulmamış cinsel temastan sonra 72 saat (3 gün) içerisinde veya her zamanki korunma metodunuz başarısız olduğunda kullanılacak bir acil doğum kontrol hapıdır.

ERTES⁷² özellikle aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır:

- Hiçbir korunma yönteminin kullanılmadığı cinsel ilişki sırasında;
- Korunma metodu yanlış kullanıldığında, örneğin kondom yırtıldıysa, sıyrıldıysa veya uygunsuz bir şekilde kullanıldıysa; oral kontraseptifin (doğum kontrol ilacı) alınması unutulduysa; rahim-içi aracınızın çıkmış olduğundan endişe duyuyorsanız; vajinal ovül veya diyafram yerinden oynadıysa, çıktıysa, kırıldıysa ya da vaktinden önce çıkarıldıysa; cinsel ilişki sırasında geri çekme yöntemi hatalı uygulandıysa ya da başarısız olduysa (ör: spermin vajina içerisinde veya dış genital bölge üzerinde boşaltılması); ısı ölçüm yöntemiyle yapılan korunmalarda cinsel ilişki üreme dönemine rastladıysa.

ERTES⁷², etkin madde olarak levonorgestrel ismiyle bilinen sentetik hormon benzeri bir etkin madde içerir. Korunulmamış cinsel ilişkiden sonraki 72 saat içinde alındığında, istenmeyen gebeliklerin %99'unu önlemektedir. ERTES⁷² gebeliği her zaman önlemez, korunulmamış cinsel ilişkiden sonra mümkün olan en kısa sürede alındığında daha etkilidir. Üçüncü güne kadar geciktirmek yerine ilk 12 saat içerisinde alınması daha iyidir.



ERTES⁷² ařađıdaki řekilde alıřtıđı dűřünülmektedir:

- yumurtalıklardan yumurta salımını durdurarak
- halihazırda yumurtalıklardan salınan bir yumurtanın sperm tarafından dűllenmesini ۆnleyerek

ERTES⁷² sadece korunulmamıř cinsel iliřkiden sonraki 72 saat ierisinde alındıđında gebeliđi ۆnleyebilir. Zaten gebe iseniz etkili olmayacaktır. ERTES⁷² kullandıktan sonra bařka bir korunmasız cinsel temas gerekleřtiđinde (ayrıca bu aynı menstrűal dűngű sırasında olursa), tablet koruyucu etkisini gűstermeyecektir. Bu durumda, yine gebelik riski vardır.

ERTES⁷² ilk adet kanamasından (menarřtan) ۆnce kullanıldıđında etkili deđildir.

2. ERTES⁷²'yi kullanmadan ۆnce dikkat edilmesi gerekenler

ERTES⁷²'yi ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Levonorgestrele ya da Bűlűm 6'da listelenen diđer maddelerden herhangi birine karřı ařırı duyarlılıđınız (alerji) varsa.
- Hamileyseniz veya hamile olabileceđinizi dűřünüyorsanız. Hamileyseniz, ERTES⁷² etkili olmayacaktır. Hamileyseniz, ERTES⁷² hamileliđinizi sonlandırmayacaktır, ünkü ERTES⁷² bir dűřűk hapi deđildir.

Eđer;

- Menstrűel periyodunuz 5 gűnden fazla geciktiyse, veya bir sonraki periyodunuza bađlı olarak beklenmeyen anormal bir kanamanız olduysa,
- 72 saat ۆncesinden daha fazla veya son periyodunuzdan itibaren korunmasız cinsel iliřki gerekleřtiyse,

hamile olabilirsiniz.

Bu durumlardan herhangi biri sizde mevcut ise, ERTES⁷² almadan ۆnce acil dođum kontrol yűnteminin sizin iin uygunluđu konusunda doktorunuzla konuřunuz. Doktorunuz sizin iin uygun olan bařka bir acil dođum kontrol yűntemini reete edebilir.

ERTES⁷²'yi ařađıdaki durumlarda DĐKKATLĐ KULLANINIZ

Ařađıdaki durumlardan birine sahipseniz, ERTES⁷² kullanmanız tavsiye edilmez.

Acil dođum kontrol yűntemi **ara sıra** kullanılan bir yűntemdir. Hibir durumda dűzenli bir dođum kontrol yűnteminin yerini almamalıdır.

Acil dođum kontrol yűntemi, gebeliđi her zaman ۆnlemez. Korunulmamıř cinsel temasın zamanı hakkında bir belirsizlik varsa veya aynı adet periyodu ierisinde 72 saatten ۆnce cinsel temasta bulunulduysa tabletler gebelik ۆnleyici etkilerini gűstermezler ve bu durumda hamile kalma riski vardır. Adet kanamanız 5 gűnden daha fazla bir sűre gecikmiřse veya beklenen adet periyodu tarihinde daha az veya fazla miktarda kanama meydana geldiđinde veya herhangi bir bařka sebeple gebelik řűphesi varsa, gebelik dıřlanmalıdır.

Eđer;

- İlacın emilimini bozan řiddetli bir ince barsak hastalıđınız (Crohn hastalıđı gibi) varsa,
- Ciddi karaciđer problemlerinizi varsa,
- Bir dıř (ektopik) gebelik (bebeđin rahim dıřında bir bűlgedede geliřtiđi durum) ۆykűnűz olduysa,



- Yumurtalıktan rahminize uzanan kanal boyunca bir enfeksiyon (salpenjit) öykünüz varsa,

Daha önceki bir ektopik gebelik ya da yumurtalıktan rahminize uzanan kanal boyunca enfeksiyon yeni ektopik gebelik riskini artırır.

Doktorunuz ERTES⁷²'nin sizin için uygun olmadığına ya da başka bir acil kontrasepsiyon yönteminin sizin için daha uygun olacağına karar verebilir.

Tüm kadınların, korunmasız cinsel ilişkiden hemen sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde acil doğum kontrol hapı alması gerekmektedir. ERTES⁷²'nin vücut ağırlığını veya vücut kütle indeksini (VKİ) arttırmada daha az etkili olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır, ancak bu kanıtlar sınırlı ve yetersizdir. Bu nedenle, ERTES⁷² vücut ağırlığı veya VKİ'ne bakılmaksızın tüm kadınlar için önerilmektedir.

Acil doğum kontrol hapı almak ile ilgili herhangi bir endişeniz varsa, bu konuyu bir sağlık profesyoneline danışmanız önerilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklarda kullanımı

ERTES⁷² ilk adet kanamasından (menarştan) önce kullanılmamalıdır.

Eğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında endişe duyuyorsanız

Cinsel ilişki sırasında kondom (kondom yırtıldıysa veya kaydıysa) kullanmadıysanız, cinsel yolla bulaşan bir hastalığa ya da HIV virüsüne yakalanmanız mümkün olabilir. ERTES⁷² cinsel yolla bulaşan bir hastalığa karşı sizi korumayacaktır, bunu sadece kondom yapabilir. Böyle bir durumdan endişe duyuyorsanız, doktorunuza, hemşirenize, aile planlama kliniğinize veya eczacınıza danışınız.

ERTES⁷²'yi ne kadar sıklıkla kullanabilirsiniz

ERTES⁷²'yi düzenli bir korunma yöntemi olarak değil, sadece acil durumlarda kullanmalısınız. ERTES⁷²'yi bir menstrüel periyodunuz dahilinde birden çok kez kullandıysanız, bu yöntem daha az güvenilir olacaktır ve menstrüel periyodunuz büyük olasılıkla daha düzensiz bir hal alacaktır.

ERTES⁷² düzenli korunma yöntemleri kadar başarılı değildir. Doktorunuz, hemşireniz veya aile planlama kliniğiniz hamile kalmanızı önleyecek daha etkili uzun süreli korunma yöntemleri hakkında size bilgi verecektir.

ERTES⁷²'yi kullandıktan sonra

ERTES⁷²'yi kullandıktan sonra, cinsel ilişkiye girmek isterseniz ve doğum kontrol hapı kullanmıyor iseniz, bir sonraki adet dönemine dek kondom veya bir kapaklı spermisid kullanmalısınız. Bunun nedeni, bir sonraki periyodunuzun bitiminden önce tekrar korunmasız cinsel temasta bulunursanız ürünün etki göstermeyecek/etkisinin görülmeyecek olmasıdır.

ERTES⁷²'yi kullandıktan yaklaşık 3 hafta sonra, ERTES⁷²'nin çalıştığından emin olmak için bir doktor muayenesi önerilir. Adet kanamanız 5 günden daha fazla bir süre gecikmişse ya da beklenenden daha az veya alışılmadık şekilde fazla miktarda ise mümkün olduğunca kısa



sürede bir doktora başvurmalısınız. ERTES⁷²'yi kullandıktan sonra hamile kalırsanız, bir doktora görünmeniz önem taşımaktadır.

Doktorunuz, size, hamile kalmanızı engelleme konusunda daha etkili olan daha uzun süreli doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi verecektir.

Doğum kontrol hapı gibi düzenli hormonal korunma yöntemine devam ediyorsanız ve hapsiz dönemde bir kanamanız olmadıysa, gebe olmadığınızdan emin olmak için bir doktora görünmelisiniz.

ERTES⁷² kullandıktan sonraki ilk periyodunuz

ERTES⁷² kullandıktan sonra, adet kanamanız genelde normal miktarda ve beklenen gününde gerçekleşecektir. Bununla birlikte, bazen beklenenden birkaç gün önce ya da sonra olabilir. Periyodunuz beklenenden 5 gün kadar daha sonra başlarsa ve anormal bir kanama eşlik ederse veya gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız, gebe olup olmadığını anlamak için bir gebelik testi yaptırmalısınız.

ERTES⁷²'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

ERTES⁷² aç ya da tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ERTES⁷²'yi kullanmamalısınız. ERTES⁷² kullandıktan sonra hamile kaldıysanız, doktorunuza görünmeniz önemlidir. ERTES⁷²'nin gösterildiği gibi kullanılması halinde, rahminizde gelişen bebeğe zarar vereceği ile ilgili kanıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte, doktorunuz gebeliğin rahmin dışında gelişip gelişmediğini (ektopik) kontrol etmek isteyebilir. Bu özellikle ERTES⁷²'nin kullanılmasından sonra ciddi karın ağrısı görüldüğünde veya geçmişte bir ektopik gebelik öyküsü söz konusu olduğunda, yumurta kanalı ameliyatı veya kalça bölgesindeki iltihaplı bir hastalık durumunda önem arz etmektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Etkin madde levonorgestrel çok az miktarda anne sütüne geçmektedir. Bebeğe zararlı olmadığı düşünülmektedir fakat endişeliyseniz tabletinizi emzirdikten hemen sonra almanız ve tablet alımını takiben 8 saat boyunca bir göğüs pompası ile sütünüzü tahliye etmeniz ve levonorgestrel uygulamasını takiben emzirmekten en az 8 saat boyunca kaçınmanız önerilir. Bu şekilde, tabletinizi bir sonraki emzirme öncesinde alabilir ve bebeğinizin anne sütü ile alacağı aktif madde miktarını azaltabilirsiniz.

Üreme yeteneği/Fertilite

ERTES⁷², adet düzensizliklerinin olasılığını artırır; bu bazen daha erken veya daha geç ovülasyon tarihine yol açabilir ve dolayısıyla doğurgan zamanı değiştirebilir. Uzun dönemde hiçbir veri bulunmamasına rağmen, ERTES⁷² ile tedaviden hemen sonra doğurganlığın hızlı bir şekilde geri dönmesi beklenir ve bu nedenle, ERTES⁷² ile acil doğum kontrolünün hemen ardından mümkün olan en kısa süre içerisinde düzenli bir doğum kontrol yöntemine devam edilmesi veya başlanması gerekir.



Araç ve makine kullanımı

ERTES⁷²'nin araç veya makine kullanımını etkilemesi olası değildir. Bununla birlikte, yorgunluk veya baş dönmesi hissederseniz, araç ya da makine kullanımından kaçınmalısınız.

ERTES⁷²'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ERTES⁷² laktoz (sığır sütünden elde edilen şeker) ihtiva etmektedir. Eğer doktorunuz size nadir bir genetik problem olan galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glukoz-galaktoz malabsorpsiyonunuz olduğunu söylemişse (bazı şekerlere karşı duyarlılığınız varsa), ERTES⁷² kullanmamalısınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ERTES⁷²'nin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini son 4 hafta içerisinde kullandıysanız, ERTES⁷² sizin için uygun olmayabilir. Doktorunuz, sizin için hormonal olmayan başka bir acil doğum kontrol yöntemi reçete edebilir (ör: bakırlı spiral (Cu-RÍA)). Şayet bu yöntem sizin için uygun değil ise veya kullanmaya uygun değilseniz, hemen doktorunuza görününüz, bu durumda çift doz ERTES⁷² almanız gerekebilir.

- Barbitüratlar ve sara (epilepsi) hastalığı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar (örneğin, primidon, fenitoin ve karbamazepin)
- Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlar (örneğin, rifampisin, rifabutın)
- HIV virüsü ile bulaşan hastalıkların (AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçlar (ritonavir, efavirenz)
- Mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (griseofulvin)
- Sarı kantaron (Hypericum perforatum) içeren bitkisel ilaçlar

Sizin için uygun dozun belirlenebilmesi için ilave bir öneriye ihtiyaç duyarsanız doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

ERTES⁷² kullandıktan hemen sonra uygun bir doğum kontrol yöntemi hakkında tavsiye almak ve gebeliğin önlenmesi için doktorunuza danışınız (Daha geniş bilgi için bkz. Bölüm 3 "ERTES⁷² nasıl kullanılır?")

ERTES⁷², diğer ilaçların uygun şekilde etki gösterme yolunu değiştirebilir.

- siklosporin isimli (bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılan) bir ilaç.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen doktorunuza ve eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ERTES⁷² nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

ERTES⁷²'yi daima tam olarak bu kullanma talimatında gösterildiği gibi veya doktorunuzun ya da eczacınızın size anlattığı gibi kullanınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Korunulmamış cinsel temastan sonra, 72 saatlik (3 gün) bir süreyi aşmaksızın, mümkün olduğunca erken, tercihen ilk 12 saat içinde alınmalıdır. Tablet almayı geciktirmeyiniz. Korunmasız cinsel temastan sonra ne kadar çabuk alırsa o kadar iyi çalışır. Korunmasız cinsel temastan 72 saat içinde alırsanız, yalnızca hamile kalmanızı önleyebilir.



- ERTES⁷², gebe değilseniz veya gebe olabileceğinizi düşünmüyorsanız adet döneminizin herhangi bir zamanında alınabilir. Tableti çiğnemeyiniz, su ile bütün olarak yutunuz.
- ERTES⁷²'nin uygun etki göstermesine engel olabilecek ilaçlardan birisini kullanıyor iseniz (bkz. Bölüm 2 “ERTES⁷²'nin diğer ilaçlar ile kullanımı”) veya bu ilaçlardan birisini son dört hafta içinde kullandı iseniz ERTES⁷²'nin sizin için etkisi azalmış olabilir. Bu durumda, doktorunuz sizin için bakırlı spiral (Cu-RİA) hormonal olmayan acil doğum kontrol yöntemi önerebilir (reçete edebilir). Şayet bu yöntem sizin için uygun değil ise veya doktorunuzu hemen görme şansınız yok ise, ERTES⁷²'den iki doz kullanabilirsiniz.
- Halihazırda doğum kontrol hapı gibi bir düzenli korunma yöntemi kullanıyorsanız, bunu düzenli olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

ERTES⁷² kullandıktan sonra başka bir korunmasız cinsel temas olduysa (ve bu aynı adet periyodu içindeyse) tabletler gebelik önleyici etkilerini göstermezler ve bu durumda yine hamile kalma riski vardır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tek tableti korunulmamış cinsel temastan sonra, 72 saatlik (3 gün) bir süreyi aşmaksızın, mümkün olduğunca erken, tercihen ilk 12 saat içinde su ile bütün olarak yutunuz. Tableti çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

ERTES⁷²'nin ergenlik öncesi yaştaki çocuklar için uygun kullanımı bulunmamaktadır. ERTES⁷²'nin çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda kullanımı uygun değildir.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer yetmezliği:

Ağır karaciğer yetmezliğinde kullanımı önerilmemektedir.

Böbrek yetmezliği:

Doz ayarlaması gerekli değildir.

Hastalanırsanız (kusarsanız) ne yapmalısınız

Tableti aldıktan sonraki üç saat içinde kusarsanız, hemen bir tablet daha almalısınız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ERTES⁷² kullandıysanız:

Birkaç tabletin bir kerede alınması durumunda, herhangi bir ciddi yan etki rapor edilmemiş olmasına rağmen, kendinizi kötü hissedebilirsiniz ya da gerçekten hastalanabilirsiniz (kusabilirsiniz) ya da vajinal kanamanız olabilir. Özellikle kendinizi kötü hissederseniz, tablet olması gerektiği şekilde çalışmıyor olabileceğinden, eczacınıza, doktorunuza, hemşirenize veya aile planlama kliniğinize öneride bulunması için danışmalısınız.

ERTES⁷²'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.



ERTES⁷²'yi kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ERTES⁷² ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ERTES⁷² tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

ERTES⁷²'nin kullanımı ile ilgili herhangi başka sorunuzun olması halinde, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ERTES⁷²'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

ERTES⁷² ile aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Çok yaygın:

- Hasta hissetme (bulantı)
- Bir sonraki periyoada kadar zaman zaman düzensiz kanama
- Karnın alt kısmında ağrı
- Yorgunluk
- Baş ağrısı

Yaygın:

- Hastalanma (kusma). Hasta hissediyorsanız, “Hastalanırsanız (kusarsanız) ne yapmalısınız” bölümünü okuyunuz.
- Sizin periyodunuz farklı olabilir. Birçok kadında beklenen zamanda normal bir periyod gözlenir, ancak bazılarında periyodun zamanı normalden sonra veya önce görülebilir. Ayrıca bir sonraki periyodunuza kadar bazı düzensiz kanamalarınız veya lekelenmeleriniz olabilir. Kanamanız 5 günden daha fazla bir süre gecikmişse ya da beklenenden daha az veya alışılmadık şekilde fazla miktarda ise mümkün olduğunca kısa sürede bir doktora başvurmalısınız.
- ERTES⁷² alımını takiben meme hassasiyeti, ishal, sersemlik hissi görülebilir.

Çok seyrek:

- Karın ağrısı, döküntü, kaşıntılı döküntü (ürtiker), kaşıntı, yüzde şişme, kalça bölgesinde ağrı, sancılı adet görme (dismenore)

Pazarlama sonrası gözlemler sonucunda aşağıdaki istenmeyen etkiler rapor edilmiştir:



Çok seyrek:

- Karın ağrısı, döküntü, ürtiker, kaşıntı, pelvis bölgesinde ağrı, sancılı adet görme (dismenore), yüzde ödem

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. ERTES⁷²’nin saklanması

ERTES⁷²’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajı içerisinde ve ışıktan uzakta saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ERTES⁷²’yi kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ERTES⁷²’yi kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Exeltis İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Kültür Mah. Nispetiye Cad. No: 56, Akmerkez
B Blok Kat: 6 D: 574 Etiler, Beşiktaş / İstanbul

Üretim Yeri:

Laboratorios León Farma S.A
C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera
24193- Leon
İspanya

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

